


Christian Steuber
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Naturheilverfahren



Clemens Bürger
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Homöopathie

Elternratgeber

Zecken

Liebe Eltern,

wenn Kinder im Freien spielen, kann es immer einmal vorkommen, dass sie von einer Zecke gebissen werden. Im Folgenden wollen wir Ihnen ein paar Tipps geben, damit Sie in so einem Fall wissen, was zu tun ist.

Warum beißen Zecken?

Zecken ernähren sich von Blut. Sie sitzen in Gebüsch und hohem Gras und warten, bis ein Mensch oder Tier an ihnen vorbeiläuft. Dann krallen sie sich fest und suchen einen geeigneten Platz um sich festzubeißen und Blut zu saugen. Zecken sind vom Frühjahr bis zum Spätherbst aktiv.

Den Biss selber merkt man in der Regel nicht, denn die Zecke spritzt Stoffe in die Bisswunde, die schmerzstillend wirken und verhindern, dass das Blut gerinnt. Diese Stoffe lösen manchmal einen Juckreiz aus.

Ist ein Zeckenbiss gefährlich?

Glücklicherweise ist ein Zeckenbiss selber nicht gefährlich und bleibt in den allermeisten Fällen bis auf eine kleine Entzündung an der Bissstelle folgenlos.

Die Zecken können allerdings durch ihren Speichel, den sie in die Bisswunde spritzen, 2 verschiedene Erkrankungen übertragen:

- die Borreliose: Dies ist eine bakterielle

Erkrankung, die in ganz Europa verbreitet ist. Es kann dabei auch nach längerer Zeit (Wochen bis Monate) noch zu Hautausschlägen, zur vorübergehenden Lähmung von Gesichtsnerven, zum Auftreten anhaltender Kopfschmerzen und zu Gelenksbeschwerden kommen. Diese sollten zu einer Vorstellung bei uns führen (kein Notfall).

- die FSME (Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis): Diese Erkrankung wird von den Zecken besonders in unserer Region übertragen. Es kann dabei zu plötzlichen Kopfschmerzen und Fieber und bei Erwachsenen auch zu bleibenden Nervenschädigungen oder Todesfällen kommen. Allerdings erkrankt man auch in einem Hochrisikogebiet nur nach einem von 1000-2000 Zeckenbissen und Kinder sind kaum gefährdet, schwer zu erkranken

Was kann ich vorbeugend tun?

Einem Zeckenbiss vorbeugen kann man nur, indem man lange Kleidung trägt und der Übertragung der Krankheiten vorbeugt. Dazu ist folgendes wichtig:

1. Zecke suchen: Zecken brauchen etwas Zeit um einen geeigneten Ort zum Blutsaugen zu finden. Auch nach dem Biss dauert es etwas, bis die Zecke anfängt, ihren Speichel in die Bisswunde zu spritzen. Je länger die Zecke Blut saugen kann, desto höher ist das Risiko, dass eine der Krankheiten übertragen wird. Wenn Ihr Kind tagsüber viel draußen war, dann suchen Sie es bitte vor dem zu Bett gehen kurz ab, um eine Zecke so bald wie möglich zu finden.

2. Zecke entfernen: Je schneller Sie eine Zecke entfernen, desto besser. Fassen Sie die Zecke dabei mit einer gewöhnlichen Pinzette oder einer Zeckenzange (Apotheke) am Kopf direkt dort, wo sie in der Haut steckt. Vermeiden Sie es dabei, den Körper der

Zecke zu quetschen! Halten Sie die Zecke gut fest und zupfeln oder ziehen Sie sie von der Haut weg. Nach der Entfernung der Zecke sollten Sie die Bissstelle desinfizieren.

Überprüfen Sie die entfernte Zecke anschließend. Wenn sie am Kopf 3 kurze Beißwerkzeuge sehen, haben sie die Zecke vollständig entfernt. Es kann allerdings auch sein, dass Teile des Kopfes in der Haut stecken bleiben. Das ist nicht schlimm! Man muss diese Teile nicht entfernen. Sie werden mit der Zeit von der Haut abgestossen.

Was soll ich nicht tun?

In alten Elternratgebern kann man noch lesen, dass man die Zecke mit Öl oder Klebstoff ersticken soll. Das darf man nicht tun, weil die Zecke vor dem Ersticken noch einmal Speichel in die Wunde spritzt und deshalb die Infektionsgefahr eher steigt!

Worauf muss ich achten?

Nach der Entfernung der Zecke müssen Sie auf Zeichen einer Infektion achten:

- Borreliose: In den meisten Fällen bildet sich nach 1-3, maximal 9 Wochen um die Bissstelle eine langsam wachsende, oft ringförmige Hautrötung. Auch ungewöhnliche Schwellungen und Rötungen an andere Stelle (Ohrläppchen) können hinweisen

- FSME: nach 1-2 Wochen kommt es zu mäßigem Fieber, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Erbrechen.

Sollten Sie bei Ihrem Kind diese Symptome bemerken, dann gehen Sie bitte zum Arzt.

Sollte es in den ersten Tagen nach der Entfernung der Zecke zu einer leichten Entzündung der Bissstelle kommen, so ist das nicht schlimm und kein Hinweis auf eine Borreliose. Sie können Ihr Kind in diesem Fall mit einer desinfizierenden Salbe selber behandeln. Das gleiche gilt auch, wenn noch Teile des Kopfes in der Bissstelle geblieben sind.

Gibt es eine Behandlung?

- wenn Ihr Kind Zeichen einer Borreliose zeigt, sollte es zur Vermeidung

von Spätproblemen mit einem Antibiotikum behandelt werden. Dies ist aber keine notfallmässige Massnahme. Ohne Infektionszeichen brauchen Sie Ihr Kind nach einem Zeckenbiss nicht behandeln.

- gegen die FSME gibt es zur Zeit keine besondere Behandlung, nur beschwerdelindernde Massnahmen, wohl aber eine vorbeugende Impfung.

Soll ich impfen?

Ein Impfung gegen FSME wird in ganz Baden-Württemberg vom Sozialministerium empfohlen und von den Krankenkassen übernommen. Wegen des geringeren Risikos der Erkrankungsschwere bei jüngeren Kindern ist eine Impfung zwar vor dem 6. Lebensjahr möglich und empfohlen, aber sich unter Abwägung auch verzichtbar.

In Süddeutschland ist die FSME vor allem im Schwarzwald, entlang des Rheins, am Bodensee und in Nord- und Ostbayern verbreitet. Auch in Teilen Österreichs kommt die FSME gehäuft vor. Sollten Sie vorhaben, in diesen Gegenden zu wandern oder zu zelten, empfiehlt sich ebenfalls eine Impfung.

Die Impfung muss 3 mal gegeben werden ist gut verträglich und bei Kindern ab einem Alter von 1 Jahr zugelassen. Sie schützt für 5 Jahre.

Da die FSME bei Erwachsenen meist schwerer verläuft als bei Kindern, sollten Sie als Eltern sich impfen lassen. Dabei kann man dann vielleicht auch gleich noch andere fehlende Impfungen nachholen. Dies können Sie kostenlos bei uns machen.

Wann muss ich zum Arzt?

Sie sollten zum Arzt gehen wenn sich die Bissstelle entweder doch stärker entzündet oder sich Zeichen einer Borreliose oder FSME zeigen.

Ihr Praxisteam.